


Badanie PROMIZING



Czy wentylacja wspomagana proporcjonalnie (PAV+) minimalizuje czas wentylacji mechanicznej w porównaniu z wentylacją wspomaganą ciśnieniem (PSV)?

P

Dorośli pacjenci wentylowani mechanicznie ≥ 24 h, u których możliwa była wentylacja w trybie wspomagania ciśnieniowego (PSV) ≥ 30 min, ale nie spełniali jeszcze kryteriów wycofania się z respiratoroterapii

I

Wentylacja wspomagana proporcjonalnie (PAV+) z utrzymaniem ciśnienia szczytowego generowanego przez mięśnie oddechowe w zakresie 5–10 cm H₂O

C

Standardowa wentylacja wspomagana ciśnieniem (PSV)

O

Liczba dni od randomizacji do skutecznego odzwyczajenia od wentylacji mechanicznej

Mediana dni do skutecznego odzwyczajenia od wentylacji mechanicznej:

7,3 (6,2 do 9,7) vs. 6,8 (5,4 do 8,8)

Hazard względny: 0,96; 95%CI: 0,80 do 1,15; p=0,58

Śmiertelność 90-dniowa:

85/287 (29,6%) vs. 76/286 (26,6%)

Współczynnik ryzyka: 1,13; 95%CI: 0,83 do 1,54); wartość 'p' nieistotna statystycznie